Eine neue europäische Art der Elateriden-Gattung *Elathous* Reitter.

Von

Otto Schwarz.

Elathous Emgei nov. spec.

Rufo-ferrugineus, subaenescens, nitidus, pube longiuscula, fulvo-grisea obductus; fronte antice subrotundata, longitudinaliter biimpressa; antennis articulo tertio secundo aequali; prothorace latitudine longiore, minus dense subtiliter punctato, angulis posticis carinatis; elytris fuscis, punctato-striatis, interstitiis punctulatis, rugulosis. — Long. 8 mill., lat. 2¼ mill.

Griechenland, Salonichi.

Braunroth, glänzend, mit feiner, abstehender, bräunlichgrauer Behaarung, die auf dem Kopf und Halsschilde nach vorn, auf den Flügeldecken nach hinten gerichtet ist, die Flügeldecken dunkler, mit sehr schwach metallischem Schimmer. Die Stirn ist nach vorn im flachen Bogen abgerundet und mit zwei kleinen Längseindrücken versehen. Das Halschild ist länger als breit, nach vorn sehr wenig verengt, am Vorderrande schmal schwarz gesäumt und fein und ziemlich weitläufig punktirt; seine Hinterecken sind kurz, fast parallel und hart am Aufsenrande gekielt. Die Flügeldecken sind mäfsig stark punktirt-gestreift, mit fein punktirten und schwach runzligen Zwischenräumen.

Von *El. Candèzei* Reitt. durch die schwächere Skulptur, von *El. Buyssoni* Reitt. durch die stärkere Streifung der Flügeldecken, von beiden durch geringere Gröfse, andere Färbung und durch die Bildung der Stirn unterschieden.

1 Ex. durch Herrn Emge aus Salonichi erhalten.

Berichtigung zu meiner *Melanotus*-Revision.

In Ann. de Fr. 1887, p. CXXXIII, hat Herr H. du Buysson eine Notiz über *Melanotus aspericollis* Muls. veröffentlicht, die von mir übersehen wurde, und nach der ein Vergleich des typischen Exemplares ergeben hat, dafs *Mel. aspericollis* Muls. = *tenebrosus* Er. ist. Deshalb ist auf S. 152, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, „var. *aspericollis* Muls.“ zu streichen und dafür zu setzen „var. *punctato-collis* Bris.“.

Otto Schwarz.